CE 0481 **Mode d'emploi**

Dispositif Médical

CAPTOSUCRES

Captosucres est composé d'un complexe d'ingrédients unique et breveté nommé le «Tritural» qui exerce une triple action :

a) Capte et lie les glucides pour réduire l'apport en calories
b) Réduit l'émission d'insuline et par conséquent le stockage des graisses
c) Augmente la combustion des graisses et permet de baisser progressivement les valeurs élevées de cholestérol.

De plus Captosucres stimule les récepteurs de satiété situés dans les parois de l'estomac.

Comment ça marche ?

Lorsque les gélules se dissolvent dans l'estomac, le complexe «tritural » gonfle et forme un gel visqueux qui enrobe les glucides de façon à inhiber ensuite l'absorption de glucides dans l'intestin. De plus le gel qui se forme remplit l'estomac et stimule les mécanorécepteurs situés dans la paroi gastrique, créant ainsi une sensation de satiété, ce qui permet de suivre un régime alimentaire pauvre en glucides et de consommer moins de nourriture.

En combien de temps captosucres va agir ?

Il va commencer à agir environ 15 à 20 minutes après la prise des gélules, une fois que le gel s'est formé, les glucides seront enrobés tout en provoquant la sensation de satiété et donc la réduction de la prise de poids.
L'action de Captosucres est purement mécanique. Celle ci n'entraine aucun effet pharmacologique ou chimique modifiant le fonctionnement de l'organisme.
Si vous suivez un régime alimentaire pauvre en glucides en sélectionnant vos aliments et si vous pratiquez un exercice physique régulier, vous constaterez une perte de poids dès la première semaine, l'action de captosucres entrainant une diminution de l'apport en calories.

Ingrédients :

800 mg du complexe tritural composé de téguments de graines de plantago ovata, d'acide citrique et de saponines de quillaja.
(Gélule = méthylcellulose hydrolique propylique)

Présentation:

Pilulier de 60 gélules

Prise des gélules :

Captosucres se prend environ 10 à 15 minutes avant les repas avec un grand verre d'eau ou de jus de fruits.

Dosage :

Prendre 3 gélules avec un grand verre d'eau 3 fois par jour avant le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner en cure d'attaque pendant 1 à 2 semaines puis passer à 2 gélules 3 fois par jours. Renouveler votre cure jusqu'à votre objectif de perte de poids atteint.

Contre indication :
Captosucres ne doit pas être utilisé dans le cas connus d'hypersensibilité à ces ingrédients, par les personnes souffrant d'affections intestinales, de maladies inflammatoires chroniques, d'occlusions intestinales, de rétrécissement de la partie gastro-intestinale à la suite de la pose d'un anneau gastrique (intervention chirurgicale).
Il ne faut pas prendre *Captosucres* en même temps que des médicaments contre la diarrhée, à cause du risque d'obstruction intestinale. Ceci concerne les médicaments comprenant des agents tels que diphénoxylate, diphénoxine, lopéramide, opiacés ou des substances médicamenteuses apparentées. Consulter le médecin ou le pharmacien en cas de doute.
Chez les diabétiques à fortes fluctuations des valeurs de glucose dans le sang (diabète instable), il est conseillé de demander l'avis de son médecin.
L'effet de médicaments pris en même temps que le complexe tritural, peut s'en trouver différé. Il faut donc toujours prendre *Captosucres* 30-60 minutes plus tard, selon l'avis du médecin traitant.

Ne pas donner de Captosucres à des enfants de moins de douze ans.

Grossesse et allaitement :
Il n'est cependant pas conseillé de suivre un régime pendant la période de la grossesse et de l'allaitement.

A conserver hors de portée des enfants.
Ne pas mâcher, sucer et broyer les gélules avec les dents.
A consommer avec la prise d'un grand verre d'eau ou de jus de fruits.

Autres indications :
L'absorption de *Captosucres* devrait aller de pair, si possible, avec une alimentation mixte saine, équilibrée et pauvre en glucides.

Il est surtout important d'avoir un apport suffisant en liquides pendant le changement de nutrition: vous devriez boire au moins 1,5 – 2 l réparties au cours de la journée d'eau ou de boissons pauvres en calories par jour. Limiter la consommation d'alcool.

Indication pour diabétiques :
Une gélule correspond à < 0,01 BE (unités de pain)

Indications de durée de conservation et de stockage :
La date de conservation minimum de cette boîte est imprimée sur le carton d'emballage. Il est préférable de ne pas utiliser ce produit après la date limite de consommation.

Conserver à température ambiante.

Pour plus de renseignements ou de conseils personnalisés,
Nous contacter au : **04.42.10.12.82**
Ou par email **:** slmt@wanadoo.fr

Fabricant :
EASYWAY GmbH
D-41429 Neuss
Allemagne
Art.-Nr.:GA 068, Rev 00, 09/2010

Distributeur :
JB Conseil slmt
1, chemin des Granettes
BP 30004
13724 Marignane Cedex
FRANCE